DIT IS EEN GENEESMIDDEL.
DE BIJSLUITER AANDACHTIG LEZEN

BENAMING

ALCASOL

SAMENSTELLING

Natrii hydrogenocarbonas 2,5 mg - Natrii boras 2,5 mg - Natrii chlorid. 6,3 mg - Polyvidon. - Rosae aqua - Methylparahydroxybenzoas - Propylparahydroxybenzoas - Aqua ad injectabilia q.s. ad 1 ml.

FARMACEUTISCHE VORM EN VERPAKKING

Steriele vloeistof voor de ogen. Druppelflesje van 9 ml.

FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP

Steriele vloeistof voor de ogen om de natuurlijke samenstelling van de tranen te herstellen. Bevat natriumbicarbonaat en natriumboraat.

REGISTRATIEHOUDER

Meda Pharma n.v. – Terhulpsesteenweg 166 – 1170 Brussel

FABRIKANT

Laboratoires Pharmaster – Erstein (F)

AANGEWEZEN BIJ

- Bepaalde drogende of prikkelende aandoeningen van het hoornvlies en van het uitwendig oogvlies.
- Tekort aan tranen (droge ogen).

OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET WORDEN VERMEDEN

- Allergie aan één van de bestanddelen van het geneesmiddel.
- Besmetting door bacteriën.

BIJZONDERE VOORZORGEN

- ALCASOL niet drinken, niet mengen met een andere vloeistof of met een ander geneesmiddel voor de ogen.
- ALCASOL is steriel: proper gebruiken en daarna het flesje goed sluiten.
- De aanbevolen dosis en gebruiksaanwijzing nauwkeurig volgen.
- Uit voorzichtigheid, de contactlenzen verwijderen alvorens de behandeling toe te passen.
- Bij ongewenste effecten (allergie, te hoge dosis, problemen met contactlenzen...), de behandeling stopzetten en de dokter raadplegen.
- ALCASOL buiten bereik van kinderen bewaren.

HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL

1 of 2 druppels in het aangetaste oog aanbrengen, om de 3 uur of volgens doktersadvies.
Na toediening van ALCASOL, met de vinger op de interne ooghoek duwen om de verspreiding van het geneesmiddel te bevorderen.

TOEDIENINGSWIJZE EN AFLEVERING

Uitwendig gebruik. Verkrijgbaar in de apotheek zonder doktersvoorschrift.

MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN

De behandeling stopzetten en de dokter raadplegen.

ONGEWENSTE EFFECTEN

ALCASOL wordt gewoonlijk goed verdragen. In bepaalde gevallen werden ongewenste effecten waargenomen: gevoel van hinder, warmte of zwelling van het oog, allergische reacties (vooral te wijten aan de bewaarmiddelen).

BEWARING

Bewaring : bij kamertemperatuur (15-25° C).
Houdbaarheid: zie de vervaldatum "EX" vermeld op de verpakking (maand / jaar)
Na opening van het flesje, mag ALCASOL nog 30 dagen gebruikt worden, mits bewaring in de koelkast.

LAATSTE BIJWERKING VAN DE BIJSLUITER

februari 2006

152 IS 260 F 13

CECI EST UN MEDICAMENT
LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE

DENOMINATION

ALCASOL

COMPOSITION

Natrii hydrogenocarbonas 2,5 mg - Natrii boras 2,5 mg - Natrii chlorid. 6,3 mg - Rosae aqua - Polyvidon. - Methylparahydroxybenzoas - Propylparahydroxybenzoas. - Aqua ad injectabilia q.s. ad 1 ml.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION

Liquide stérile pour les yeux. Flacon stilligoutte de 9 ml.

GROUPE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Liquide stérile pour les yeux servant à restaurer la composition naturelle des larmes. Contient du bicarbonate et du borate de sodium.

TITULAIRE D'ENREGISTREMENT

Meda Pharma s.a. – Chaussée de la Hulpe 166 – 1170 Bruxelles

FABRICANT

Laboratoires Pharmaster – Erstein (France)

INDIQUE DANS

- Certaines affections desséchantes ou irritantes de la cornée et de la membrane externe de l'oeil.
- L'insuffisance de larmes (yeux secs).

CAS OU L'USAGE DU MEDICAMENT DOIT ETRE EVITE

- Allergie à l'un des composants du médicament.
- Infections à bactéries.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

- Ne pas boire ALCASOL ni le mélanger à un autre liquide ou médicament pour les yeux.
- ALCASOL est stérile : veiller à l'utiliser proprement et à bien refermer le flacon.
- Respecter soigneusement la dose et le mode d'emploi recommandés.
- Par prudence, enlever les lentilles de contact avant d'appliquer le traitement.
- En cas d'effet non désiré (allergie, trop forte dose, problème de lentilles...), arrêter le traitement et consulter le médecin.
- Conserver ALCASOL hors de portée des enfants.

COMMENT UTILISER ET EN QUELLE QUANTITE

Mettre 1 ou 2 gouttes dans l'oeil atteint, toutes les 3 heures ou selon l'avis du médecin.
Après application de ALCASOL, presser avec le doigt l'angle interne de l'oeil pour favoriser la diffusion du médicament.

VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Usage externe.
Délivré en pharmacie sans ordonnance.

MESURES EN CAS D'UTILISATION DE TROP FORTES DOSES.

Arrêter le traitement et consulter le médecin.

EFFETS NON DESIRES

ALCASOL est généralement bien supporté. Dans certains cas, des effets non désirés ont été constatés: sensation de gêne, chaleur ou gonflement de l'oeil, réactions allergiques (dues surtout aux agents conservateurs).

CONSERVATION

Conserver à température ordinaire (15-25°C)
Voir la date de péremption "EX" sur l'emballage (mois, année).
Après ouverture du flacon, ALCASOL peut être utilisé dans les 30 jours à condition d'être conservé au réfrigérateur.

DATE DE DERNIERE REVISION DE LA NOTICE

février 2006

152 IS 260 F 13